


Overgang NEXT-MS naar SUPERNEXT

- Alle deelnemers van de NEXT-MS studie kunnen gevraagd worden om deel te nemen aan de SUPERNEXT. Daarnaast kunnen ook geheel nieuwe patiënten gevraagd worden om deel te nemen.

Deelname SUPERNEXT



- In de verlengd doseren groep: dalspiegel bepaling bij elke derde behandeling met natalizumab, waarna met het stroomschema 'Behandelschema Natalizumab' bepaald wordt of het interval nog verder verlengd kan worden. Bij een dalspiegel onder de 1.00 µg/ml wordt het interval verkort, behalve als het interval al 6 weken is; in de verlengd doseren groep wordt het behandelinterval nooit korter dan 6 weken, ongeacht een lage dalspiegel.
- Bij patiënten die subcutane behandeling met natalizumab krijgen moet de dalspiegel vóór elke behandeling bepaald worden.
- Bepaling van de dalspiegel via een vingerprik is mogelijk bij patiënten die moeilijk te prikken zijn.

Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met één van de onderzoekers via e-mail of telefoon.

- Website: www.vumc.nl/nextms
- E-mail: Next-ms@amsterdamumc.nl
- Tel: 06-50087629

Uitvoerend onderzoeker: Drs. Liza Gelissen.
Coördinerend onderzoeker: Drs. Zoé van Kempen.
Hoofdonderzoeker: Prof. Dr. Joep Killestein.

Behandelschema Natalizumab

START

Versie 1, d.d. 17-11-2023

