

Wat u moet weten na het verwijderen van een poliep uit de dikke darm

Geachte heer, mevrouw,

Op _____ zijn er één of meerdere poliepen uit uw dikke darm verwijderd.

Na deze behandeling mag u weer gewoon eten en drinken. Ook mag u alle medicijnen weer innemen, tenzij uw arts iets anders met u heeft afgesproken.

Hoewel het weghalen van poliepen een veilige behandeling is, is het belangrijk dat u weet wat u kunt doen bij eventuele problemen.

Omdat complicaties van het weghalen van poliepen soms pas lang na de behandeling optreden, is het belangrijk dat u dit formulier zeker twee weken bewaart.

Normale verschijnselen na poliepverwijdering

Het kan voorkomen dat u na de behandeling wat last heeft van een gevoelige buik. Meestal wordt dat veroorzaakt door de ingeblazen gas (CO₂). Dit gas zal de darm via de natuurlijke weg verlaten, door uitademen en het laten van windjes. Ook kan er enig bloedverlies uit de anus optreden. In het algemeen hoeft u zich daarover geen zorgen te maken.

Wanneer moet u zeker contact opnemen met het ziekenhuis?

Als u **hevige buikpijn** heeft, of **koorts**, dan kan dat wijzen op een gaatje in de darm. Als u **bloed** blijft verliezen, dan kan dat wijzen op een nabloeding.

In beide gevallen en bij twijfel moet u contact opnemen met het ziekenhuis.

Contact

Kantooruren:

De poliklinische zorgenheid maag-darm-leverziekten

Telefoon (020) 444 1125

Buiten kantooruren:

De afdeling spoedeisende hulp

Telefoon (020) 444 3636,

vraag dan naar de dienstdoende maag-, darm- leverarts

Indien u, na telefonisch contact, wordt gevraagd om naar de afdeling Spoedeisende hulp te komen, neemt u dan dit document mee!

Aanvragend arts: _____

Uitvoerende endoscopist: _____