

Plaatsing van een PEG-sonde

Binnenkort wordt er bij u een PEG-sonde geplaatst. In deze folder vindt u hierover meer informatie.

- Wat is een PEG-sonde?
- Waarom krijgt u een PEG-sonde?
- Welke voorbereiding is noodzakelijk?
- Hoe gaat de plaatsing van een PEG-sonde in zijn werk?
- Nazorg

Wat is een PEG-sonde?

PEG staat voor Percutane Endoscopische Gastrostomie. Door middel van een endoscopie wordt rechtstreeks via de buikwand een voedingssonde in de maag geplaatst. Om de PEG-sonde te bevestigen bevindt zich in de maag een fixatieplaatje óf een ballonnetje gevuld met wat water. Via de PEG-sonde is het mogelijk om sondevoeding, vocht en/of medicijnen toe te dienen.

Waarom krijgt u een PEG-sonde?

Er zijn verschillende redenen waarom het nodig is om een PEG-sonde te plaatsen. De redenen kunnen verschillen maar het is altijd zo dat de verwachting is dat u langere tijd sondevoeding of medicatie nodig zult hebben.

- Nadat u toestemming heb gegeven voor het plaatsen van een PEG-sonde vraagt uw behandelend arts deze aan bij de afdeling Maag-, darm- en leverziekten (MDL)
- U krijgt een afspraak voor een consult bij de MDL-arts.
- De MDL-arts beoordeelt of de PEG-sonde noodzakelijk en mogelijk is en informeert u over de behandeling en de risico's. Ook kunt u de arts vragen stellen die u nog heeft.
- U ontvangt per post, telefonisch of via uw digitaal patiëntenportaal (Mychart) een oproep voor de PEG-plaatsing.

Welke voorbereiding is noodzakelijk?

- Bloedverdunners zoals acetylsalicylzuur (ascal) kunt u gewoon doorgebruiken. Met andere soorten bloedverdunners moet u stoppen vóór de PEG-sondeplaatsing. Hoelang van tevoren u moet stoppen bespreekt u met uw behandelend arts.
- 6 uur vóór de plaatsing van de PEG-sonde mag u niets meer eten of drinken.

Hoe gaat de plaatsing van een PEG-sonde in zijn werk?

- U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling KNO. De afdeling KNO ligt op de eerste verdieping in het ziekenhuis. U zult daar tenminste een nacht blijven.
- Op de afdeling KNO krijgt u voorafgaand aan de PEG-plaatsing een infuus met antibiotica.
- Op de afgesproken tijd wordt u ontvangen in de voorbereidingsruimte van de

endoscopie-unit.

- In de endoscopiekamer krijgt u een slaapmiddel toegediend.
- Na het plaatsen van de PEG-sonde komt u in de herstelkamer van de endoscopie-unit.
- Wanneer u goed wakker bent, gaat u terug naar de afdeling KNO ter observatie, meestal voor een nacht.

Nazorg: na de operatie

Vanaf een uur na de plaatsing van de PEG-sonde, als u goed wakker bent, mag u weer eten en drinken óf starten met sondevoeding. Mogelijk heeft u wat extra pijnstilling nodig, deze krijgt u van de zaalarts.

Na de plaatsing van de PEG-sonde krijgt u van de verpleegkundige op de afdeling KNO uitleg over de verzorging van de PEG-sonde. De firma Sorgente maakt telefonisch een afspraak met u of met uw contactpersoon om de benodigdheden voor de PEG-sonde bij u thuis af te leveren.

De volgende dag komt de MDL-arts bij u langs, voordat u met ontslag mag.

Nazorg thuis

De dag waarop u thuis komt, komt ook een verpleegkundige van de firma Sorgente bij u thuis. Hij of zij leert u in hoe u de PEG-sonde gebruikt en verzorgt. Sorgente is een toeleveringsbedrijf gespecialiseerd in sondevoeding en toedieningswijzen. U ontvangt van de verpleegkundige van Sorgente een pakket met benodigdheden voor de verzorging van de PEG-sonde en een eerste hoeveelheid sondevoeding, ook als u deze nog niet hoeft te gebruiken. Sorgente is voor u het eerste aanspreekpunt voor de verzorging en het gebruik van de PEG-sonde.

Nazorg: vervolgafspraken op de polikliniek

7 tot 10 dagen na de plaatsing van de PEG-sonde heeft u een consult bij de PEG-verpleegkundige in Amsterdam UMC, locatie VUmc. De PEG-verpleegkundige voert spreekuur in de polikliniek MDL. De eerste controle na een week vindt standaard plaats. Verdere bezoeken aan het spreekuur van de PEG-verpleegkundige hangen af van het soort sonde die u heeft, van het gebruik van de PEG-sonde en eventuele complicaties die zich kunnen voordoen. Afspraken met de PEG-verpleegkundige lopen via de polikliniek MDL.

Complicaties

Het kan voorkomen dat tijdens de procedure blijkt dat het niet mogelijk is om de beoogde sonde te plaatsen. Wanneer dat het geval is, zal de MDL-arts alternatieven met u bespreken.


In een enkel geval ontstaat er een complicatie bij de behandeling. De mogelijke complicaties moeten van tevoren met u zijn besproken door de MDL-arts. Een complicatie kan reden zijn om u langer in het ziekenhuis op te nemen dan gepland.

Contactgegevens:

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, neemt u dan contact op met de polikliniek Maag-, darm- en leverziekten via telefoonnummer 020-444 1125.

Ook kunt u gebruik maken van het digitaal patiëntenportaal (Mychart)

Heeft u vragen over toelevering van sondevoeding of materialen of de verzorging van de PEG-sonde, neemt u dan contact op met



www.sorgente.nl

- Per e-mail : teamsondevoeding@sorgente.nl
- Telefonisch via : 030 – 6346269 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00)
- In geval van spoed 24/7 telefonisch via : 030 – 634 6269