

CRH test

In overleg met uw behandelend arts is er besloten een CRH test bij u uit te voeren. CRH staat voor Corticotrope Releasing Hormoon. Dit zorgt ervoor dat de hypofyse ACTH aanmaakt en dat vervolgens de bijniere cortisol gaan produceren.

Doel van de test

Het doel van de test is het vaststellen van een tekort aan cortisol.

Vorbereiding

Voor een CRH test moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u op de avond voor het onderzoek vanaf 24.00 uur niet meer mag eten en drinken. Uw behandelend arts overlegt met u of u tijdelijk met medicijnen moet stoppen voor de test.

Dag van de test

U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de balie van de dagbehandeling. Deze vindt u op de vierde verdieping van de polikliniek, receptie W. Vanaf de hoofdingang kunt u de bordjes naar receptie W volgen.

CRH test

Gedurende de test ligt u op een bed. De verpleegkundige brengt een infuus in uw arm. Een arts van endocrinologie dient via het infuus CRH toe. Voor en na het toedienen van de CRH wordt er bloed afgenomen. De bloedafname gebeurt via een apart kraantje dat aan de infuusslang is gekoppeld. U voelt hier niets van.

Bijwerkingen

Vlak na het inspuiten van de CRH kunt u een warm gevoel in uw gezicht krijgen. Dit zal na maximaal 20 minuten afzakken of weg zijn.

Duur van de test

De test duurt in totaal ongeveer 3 uur. Omdat u de avond van tevoren vanaf 24.00 uur nuchter bent, is het raadzaam een boterham mee te nemen. Ook kunt u na de test eventuele uitgestelde medicijnen weer innemen. U kunt na de test zelf met de auto of het openbaar vervoer naar huis.

Uitslag

Ongeveer twee weken na de test bespreekt uw behandelend arts de uitslag met u.

Vragen

Voor verdere vragen kunt u bellen met de dagbehandeling. Deze is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur. T (020) 444 0647