

# Speuronderzoek

Uw behandelend arts heeft met u besproken dat een speuronderzoek van de schildklier bij u verricht moet worden. Dit onderzoek is ter voorbereiding op een behandeling met radioactief jodium. Radioactief jodium wordt toegediend wanneer de schildklier te snel werkt of vergroot is. Het maken van de scan duurt ongeveer 30 minuten. Houd er rekening mee dat u 24 uur na het innemen van de capsule terug moet komen voor de scan en dat u na het onderzoek nog een gesprek heeft met de nucleair geneeskundige over de uitslag van het onderzoek.

## Vorbereiding

- Als u zwanger bent, dit vermoedt of borstvoeding geeft, dient u dit aan uw behandelend arts te melden.
- In overleg met uw behandelend arts moet u eventuele schildklier medicijnen vier dagen voor het onderzoek staken.
- Drie weken voor het onderzoek moet u eventueel het gebruik van Thyrox® staken. Twee dagen na het innemen van de capsule mag u weer starten met het innemen van Thyrox®.
- We adviseren u 10 dagen voor het onderzoek een jodiumarm dieet te volgen.
- Als u de laatste weken een röntgenonderzoek heeft gehad waarbij contrastvloeistof is ingespoten, moet u dit ook melden. De gebruikte contrastvloeistof kan de schildkliermeting beïnvloeden.

## Het maken van de scan

Ter voorbereiding op het onderzoek krijgt u een capsule met radioactief jodium (speurdosis). Deze moet u met een klein beetje water innemen. De speurdosis heeft geen bijwerkingen en moet 24 uur inwerken. Tijdens deze 24 uur mag u gewoon naar huis en hoeft u geen leefregels in acht te nemen.

De volgende dag meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de afdeling nucleaire geneeskunde/PET.

Tijdens het maken van de scan ligt u op een bed. Het is belangrijk dat u goed stil blijft liggen tijdens de scan. Een geringe verschuiving kan problemen veroorzaken bij het beoordelen van de scan.

Ongeveer een uur na het onderzoek zal de nucleair geneeskundige de uitslag van de foto's met u doornemen.

U kunt direct na het onderzoek weer doen wat u gewend bent. De meeste stoffen verlaten via de urine het lichaam. Het is daarom aan te bevelen om de rest van de dag wat meer te drinken dan u gewoonlijk doet. Op die manier wordt de overtollige radioactieve stof snel uit het lichaam gespoeld. Het is gewenst dat heren zittend plassen.

## **Uitslag**

De foto's moeten eerst op de computer worden bewerkt voordat ze door een arts van de afdeling kunnen worden beoordeeld. De arts maakt een verslag van het onderzoek en stuurt dit naar uw behandelend arts, die u de uitslag geeft.

## **Belangrijk**

Wij verzoeken u vriendelijk om op tijd aanwezig te zijn voor het onderzoek. De stoffen worden speciaal voor u klaargemaakt en zijn maar kort houdbaar. De afspraken zijn voor ieder onderzoek weer anders daarom luistert het schema erg nauw. Omdat het onderzoek kostbaar is stellen wij het op prijs dat u ons tijdig op de hoogte stelt indien u verhinderd bent.

## **Vragen**

Als u nog vragen heeft over het onderzoek kunt u contact met ons opnemen van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 – 16.00 uur, telefoon (020) 444 2886.

Voor medische vragen moet u contact opnemen met uw behandelend arts.

Alle folders kunt u opvragen via de poli van uw behandelend arts of via onze website [www.vumc.nl](http://www.vumc.nl). Ga naar alle specialismen/centra, daar kiest u voor Radiologie en nucleaire geneeskunde. Onder Patiënteninformatie radiologie en nucleaire geneeskunde staan alle folders.

## **Informatie over radioactiviteit en straling**

Straling is overal om ons heen; in de bodem, in muren van woningen, in ons voedsel en in het lichaam zelf. Dit heet natuurlijke straling. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van kunstmatige straling voor uiteenlopende toepassingen, zoals medische onderzoeken. In grote hoeveelheden kan straling schadelijk zijn. De hoeveelheid die u krijgt toegediend tijdens dit onderzoek is echter zo laag, dat de kans op schadelijke gevolgen voor u verwaarloosbaar is. De stralingsdosis is te vergelijken met de dosis die u krijgt bij een röntgenonderzoek. De toegediende stof heeft geen bijwerkingen en na enkele uren is de meeste straling al weer verdwenen. Familie of vrienden lopen geen extra risico en kunnen u veilig begeleiden. Houd wel rekening met zwangere vrouwen en kleine kinderen.

**We raden het zeer af om zwangere vrouwen en/of kinderen mee te nemen naar het onderzoek.** De arts of laborant die u begeleidt kan u daar meer over vertellen.

## **Zwangerschap en borstvoeding**

Ongeboren baby's zijn veel gevoeliger voor radioactieve straling dan volwassenen.

Wanneer u zwanger bent of denkt het te zijn, dan moet u dit melden vóórdat u de injectie krijgt. Na overleg met uw behandelend arts kan besloten worden om, in het belang van het kind, de hoeveelheid radioactiviteit aan te passen of het onderzoek uit te stellen tot na de zwangerschap.

Sommige radioactieve stoffen komen in de moedermelk terecht. Geeft u borstvoeding, dan moet u dit melden vóórdat u de injectie krijgt. Wij kunnen u dan vertellen of het nodig is om tijdelijk de borstvoeding af te kolven. De voeding is in de meeste gevallen na enkele dagen in de koelkast of vriezer gewoon te gebruiken.