

Waterbreuk


Hydrocèle

Deze folder bevat algemene informatie. Het is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts.

Uw kind is patiënt bij de afdeling Kinderurologie van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Dit is een universitair medisch centrum waar medisch specialisten worden opgeleid. Zij doen zelfstandig spreekuren en assisteren bij operaties. Hierdoor kan het voorkomen dat u een afspraak heeft bij uw kinderuroloog en een andere dokter aantreft. Hij of zij werkt zelfstandig, maar altijd onder verantwoordelijkheid van uw kinderuroloog. Als u het op prijs stelt uw eigen kinderuroloog te spreken, kunt u dit aangeven als u een afspraak maakt. Indien mogelijk proberen wij met uw wens rekening te houden.

Wat is een waterbreuk?

Uw kind wordt behandeld voor een scrotale afwijking, een zogenoemde waterbreuk (). Bij een jongetje dalen de testikels vlak voor de geboorte of kort erna in het balzakje. Daardoor ontstaat er een open verbinding tussen de buikholte en de ruimte rondom het balletje. Meestal gaat deze verbinding in de loop van de eerste achttien maanden dicht. Als de verbinding open blijft, kan er vocht in de ruimte rond het balletje terechtkomen. Bij uw kind is deze open verbinding niet dichtgegaan.



Op het eerste plaatje is er een open verbinding tussen het vlies rond het balletje en de buikholte. De verbinding is erg nauw zodat er alleen wat vocht doorkan: er is een waterbreuk. Op het tweede plaatje is de verbinding groter, waardoor er ook een stukje darm in het vlies kan zakken: er ontstaat een liesbreuk.

Een operatie is nodig om de verbinding tussen de buikholte en het balzakje dicht te maken zodat er geen zwelling meer kan ontstaan. Is de open verbinding zo wijd dat er buikinhoud in terecht kan komen, dan spreken we van een liesbreuk. Ongeveer tien procent van de jongetjes die worden geboren met een waterbreuk moet daar uiteindelijk aan worden geopereerd.

De operatie

De ingreep gebeurt meestal poliklinisch in dagbehandeling. Dat betekent dat uw kind dezelfde dag weer mee naar huis kan. De ingreep gebeurt onder algehele narcose. De anesthesist informeert u over de narcose.

Hoe verloopt de operatie?

Bij uw kind wordt een sneetje in de lies gemaakt. De kinderuroloog maakt de verbinding tussen de buikholte en het balzakje dicht.

Het vocht kan zich dan niet meer ophopen. Het hechten van de wond gebeurt onderhuids en op de wond komt een pleister.

Na de operatie

Meestal kan uw kind op de dag van operatie weer naar huis. Uw kind kan na de operatie twee tot drie dagen last hebben van de ingreep. Tijdens deze dagen kunt u uw kind tegen de pijn een paracetamol zetpil geven. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind kunt u de dosering aanhouden zoals op onderstaand schema is aangegeven.

Dosering paracetamol zetpil:

Leeftijd	Milligram	Aantal per 24 uur
Kind van 0 tot 1 jaar	120 mg	3 à 4 zetpillen
Kind van 1 tot 3 jaar	240 mg	3 à 4 zetpillen
Kind van 3 jaar en ouder	500 mg	3 à 4 zetpillen

Mocht uw kind na drie dagen nog wat pijn hebben, dan kunt u nog een zetpil geven. Het verlies van een beetje bloed uit de wond en soms een bloeditstorting op het balzakje zijn normaal. U dient contact op te nemen met het ziekenhuis als uw kind veel bloed verliest, als uw kind koorts krijgt (meer dan 38.5 °C) of als de wond rood wordt. De telefoonnummers vindt u onder het kopje in deze folder. Na drie maanden komt uw kind terug op de polikliniek Kinderurologie voor controle.

Veelgestelde vragen

Gaat de hechtpleister er vanzelf af?

Meestal zal de pleister er in bad of onder de douche vanzelf af gaan en hoeft er geen nieuwe pleister meer op. Is de pleister er na tien dagen niet afgegaan, dan kunt u de pleister er zelf afhalen. Alle hechtingen lossen vanzelf op.

Mag mijn kind in bad of onder de douche?

Ja, maar laat uw kind de eerste twee weken niet te lang in bad of onder de douche, maximaal tien minuten.

Mag mijn kind weer alles doen na de operatie?

De eerste paar dagen heeft uw kind wat last van de ingreep. Maar in principe kan uw kind weer alles zelf doen.

Wanneer mag hij weer zwemmen?

Uw kind mag twee weken na de ingreep niet zwemmen. In het meeste zwembadwater zit chloor en dat is niet goed voor het genezingsproces.

Hoe zit het met sporten?

Is uw kind in de leeftijd dat hij op een sport zit, dan mag hij twee weken niet sporten. Dit

is om uw kind te beschermen tegen harde ballen bij sporten zoals bij voetbal, hockey enzovoorts.

Mag hij meedoen aan gym op school?

Ook hier geldt dat uw kind twee weken niet mee kan doen aan schoolgym.

Bij hoeveel kinderen ontstaat een waterbreuk?

Bij de meeste kinderen verkleeft de ingang tussen de buikholte en de balzak vanzelf. Bij ongeveer tien procent van de kinderen gebeurt dit niet en is een operatie nodig om de ingang dicht te maken. In de meeste gevallen gebeurt dit als het kind ouder dan achttien maanden is.

Is mijn kind nu minder vruchtbaar?

De kans dat er door de operatie schade ontstaat aan de bloedvaten van het balletje of aan de zaadleider is erg klein. Dus in principe heeft deze ingreep geen gevolgen voor de vruchtbaarheid van uw kind. In een aantal gevallen is het balletje in aanleg van mindere kwaliteit. Een operatie zal de kwaliteit niet kunnen verbeteren.

Wat is een liesbreuk?

Een liesbreuk ontstaat als de open verbinding tussen de buikholte en de ruimte rondom het balletje erg breed is en er dan bijvoorbeeld een stukje darm in terecht komt. Om te zorgen dat de darmen niet klem komen te zitten, is een operatie nodig.

Informatie

Verpleegkundig spreekuur

Als u zich ongerust maakt of vragen heeft over diagnose, onderzoek of behandeling, kunt u telefonisch contact opnemen met het verpleegkundig spreekuur van de afdeling Urologie via (020) 444 0229.

Het verpleegkundig spreekuur is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur.

Spoed

Voor spoedeisende zaken kunt u het ziekenhuis bereiken tijdens kantooruren, via de polikliniek Urologie op nummer (020) 444 1103. Buiten deze tijden kunt u het algemene nummer van het ziekenhuis bellen (020) 444 4444 en vragen naar de dienstdoende uroloog.

Daarnaast kunt u terecht op de website: www.vumc.nl/urologie.