

Ciclosporine

(Neoral®)

Uw dermatoloog heeft u ciclosporine voorgeschreven voor de behandeling van uw huidaandoening. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Lees daarom behalve deze folder ook de bijsluiter van de apotheek.

Het effect van ciclosporine

Met medicijnen is de oorzaak van uw huidaandoening niet weg te nemen. Wel zijn er medicijnen die deze aandoeningen rustiger kunnen maken. Ciclosporine is zo'n medicijn. Het kan enige tijd duren voordat u merkt dat het begint te werken.

Ciclosporine kan gebruikt worden voor de behandeling van ernstige psoriasis, atopisch eczeem, chronische discoidale lupus erythematosus (CDLE), bepaalde blaarziekten, lichen ruber planus en lepra.

Indien ciclosporine een gunstig effect heeft, kunt u het jarenlang blijven gebruiken. Helaas heeft het niet bij iedereen een gunstig effect. Als het bij u niet werkt of als u teveel last heeft van bijwerkingen, kan de arts besluiten het gebruik van ciclosporine stop te zetten. Ciclosporine wordt behalve bij dermatologische aandoeningen ook gebruikt bij reumatische aandoeningen en bij het voorkomen van afstotings- verschijnselen die kunnen optreden bij orgaantransplantaties.

Het gebruik samen met andere geneesmiddelen en voedingsmiddelen

Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke geneesmiddelen u gebruikt. Over het algemeen kunt u ciclosporine in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Er zijn echter enkele medicijnen, zoals onder andere pijnstillers (NSAID's), antischimmelmiddelen, sommige antibiotica, hartmedicijnen, medicijnen tegen epilepsie en sommige cholesterolverlagende medicijnen, die de werking van ciclosporine beïnvloeden. Ook grapefruitsap en het sint Janskruid beïnvloedt de werking van ciclosporine. Daarnaast mag u niet te veel voedingsmiddelen nemen waar te veel kalium in zit (bijvoorbeeld tomaten, vlees, aardappelen).

Wijze van innemen

De voorgeschreven hoeveelheid capsules of drank is berekend op uw lichaamsgewicht. Uw arts vertelt u hoeveel capsules u per dag moet gebruiken. Houdt u zich altijd aan de voorgeschreven dosis. Neem ciclosporine 's ochtends en 's avonds in op vaste tijden. U mag dit niet innemen met grapefruitsap. Als u de capsule of de drank vergeten hebt in te nemen, neem ze dan nog dezelfde dag op een later tijdstip in. Ontdekt u het pas een dag later, neem dan die dag weer de normale hoeveelheid tabletten in. Neem nooit een dubbele dosering.

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van Ciclosporine vermeld die ooit

zijn voorgekomen. De meest voorkomende zijn:

- Tijdelijk verminderde nierfunctie
- Tijdelijk hoge bloeddruk
- Maag- en darmklachten zoals misselijkheid en braken of diarree

Als u last heeft van bijwerkingen, kunt u in overleg met uw arts de dosering aanpassen of stoppen met het gebruik van ciclosporine.

Controles

Om de bijwerkingen in een vroeg stadium te ontdekken zal uw arts regelmatig uw bloeddruk meten en uw bloed laten onderzoeken.

Dit gebeurt de eerste periode meestal elke twee weken. Hierna vinden de controles minder vaak plaats. De uitslag van de onderzoeken is na enkele dagen bij uw arts bekend.

Het effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Het is belangrijk om uw arts te informeren als u een zwangerschap overweegt of als u zwanger bent. Het is het nog niet zeker of ciclosporine veilig is voor het ongeboren kind, dus u kunt dit medicijn beter niet gebruiken tijdens een zwangerschap. U mag geen ciclosporine gebruiken als u borstvoeding geeft. Het medicijn wordt namelijk in de moedermelk uitgescheiden. Overleg de situatie met uw arts.

Aanvullende informatie

- Wees voorzichtig met alcoholgebruik. In combinatie met het gebruik van ciclosporine is de kans groter dat u maagklachten krijgt.
- Bewaar geneesmiddelen altijd zó dat kinderen er niet bij kunnen.
- Als u de capsule of drank overhoudt, lever deze dan in bij de apotheek. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd.
- Houdt u aan de afspraken voor bloedcontrole.
- Tijdens gebruik mogen geen levende vaccins gegeven worden. Informeer hiervoor bij de huisarts voordat u zich laat vaccineren.

Vragen

Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact op en vertel duidelijk dat u ciclosporine gebruikt.

- T (020) 566 2530
- F (020) 566 9185
- E poli.dermatologie@amc.nl (voor niet-dringende zaken)
- Stuur een bericht via MyChart