

Sedatie

Polikliniek maag-, darm en leverziekten

Uw behandelend arts heeft voor u een onderzoek of behandeling met sedatie afgesproken op de endoscopie-unit van de polikliniek MDL.

Sedatie houdt in dat u wat slaperig wordt en daardoor wat minder van het onderzoek merkt. In de volksmond spreekt men wel van een 'roesje'. In de folder leest u wat u van sedatie kunt verwachten en waar u rekening mee dient te houden

Het doel van sedatie

Het doel van sedatie is dat u wat slaperig wordt zodat u van het onderzoek minder merkt. Deze slaperigheid treedt bij sommige mensen direct na de injectie op, bij anderen pas na enige tijd. Op voorhand is niet te voorspellen wat uw reactie op het medicijn zal zijn. Het voordeel van sedatie is dat u, anders dan bij narcose, niet hoeft te worden beademd en de artsen en verpleegkundigen met u kunnen praten. Ook blijven uw reflexen intact waardoor het risico op complicaties, bijvoorbeeld door verslikken, kleiner is dan bij narcose. Vaak vergeet u na het onderzoek wat er is gebeurd (retrograde amnesie).

De werkwijze

- U meldt zich 45 minuten voor de afgesproken tijd op de polikliniek MDL, locatie VUmc, receptie Q.
- De verpleegkundige van de herstelkamer haalt u op en wijst u een brancard toe waarop u plaatsneemt. Uw persoonlijke eigendommen blijven bij u op de brancard.
- U krijgt een infuusnaald ingebracht in een bloedvat in uw arm of hand.
- Op de brancard gaat u naar de behandelkamer.
- Door middel van een clipje op uw vinger wordt gecontroleerd of uw hartslag en het zuurstofgehalte in uw bloed goed zijn. Ook wordt uw bloeddruk gemeten. Door de infuusnaald wordt het slaapmiddel (midazolam) toegediend. Gedurende het onderzoek blijft u verbonden aan de meter voor uw hartslag, bloeddruk en het zuurstofgehalte in het bloed.
- Na afloop van het onderzoek wordt u op de brancard naar de herstelkamer gereden. U verblijft minimaal één uur op de uitslaapkamer tot u weer goed wakker bent. De verpleegkundige belt uw begeleider als u wakker bent.
- Als zich geen bijzonderheden hebben voorgedaan, krijgt u na een uur iets te drinken en wordt de infuusnaald verwijderd. Als u goed wakker bent mag u met uw begeleiding naar huis.

Bijzondere omstandigheden

In sommige gevallen, bij slechte hart- en/of longfunctie, kan de arts die het onderzoek uitvoert, besluiten af te zien van toediening van het slaapmiddel, vanwege het risico op complicaties.

Tot besluit

Omdat de middelen die bij sedatie worden toegediend invloed hebben op uw beoordelings- en reactievermogen mag u na sedatie niet actief deelnemen aan het verkeer. Daarom vragen wij u om u te laten begeleiden. Heeft u geen begeleiding kunnen regelen, dan kan de sedatie niet worden toegediend en kan de behandeling geen doorgang vinden. U mag gedurende 24 uur niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer! Ook belangrijke afspraken kunt u beter uitstellen tot na de eerste 24 uur.

Bij vragen kunt u bellen naar de polikliniek MDL: 020-444 1125.